Fokverslag van de kastanjevleugelgaailijster – Garrulax berthemyi

Door BvR / foto's auteur en internet.

In de volksmond wordt deze vogel nog steeds als blauwooggaailijster betiteld.
Deze benaming is goed te begrijpen als je de vogels bekijkt. Naast hun mooie warme roestbruine kleur, is het meest opvallend aan de vogel de blauwe naakte huid rond het oog, uitlopend in een punt. De mannen produceren een leuke zang. Deze zang is echter niet te vergelijken met die van de witwanggaailijsters. Dit zijn de topzangers onder de gaailijsters. Tijdens de balts fladderen de kastanjeruggaailijsters met hun vleugels terwijl zij hun lokroep voor het popje laten horen.
Door ruil verkreeg ik een koppel van deze vogels. Het koppel had volgens de eigenaar vorig jaar 1 jong groot gebracht. Bij aankomst bleken beide vogels niet geringd en zonder DNA. Ze zaten in een te klein hok en de pop was erg kaal gepikt door de man. Dit is iets wat veel voorkomt, met name bij deze soort. Omdat ik het meeste belang had bij het koppel Sanblasgaaien dat in de ruil betrokken was, heb ik de vogels toch maar meegenomen.

Na een korte gewenning heb ik de pop alleen in de volière gezet in de hoop dat haar verenkleed weer zou herstellen. Deze volière was 3,5 bij 2 bij 1,5 meter. Hierin waren kunstgroen en dode coniferen aangebracht. Op verschillende hoogten waren plantenmandjes aangebracht die als broedgelegenheid moesten dienen. Na enkele weken was nog weinig van aangroei van veren waar te nemen. Daarentegen werd de man steeds broedser. Uiteindelijk heb ik de man bij de pop in de volière geplaatst. Het klikte meteen en de man begon direct en veelvuldig te baltsen.
Na korte tijd werd er in een van de mandjes een mooi nestje gemaakt van kokosvezel. Hierin werden 4 felblauwe eieren gelegd.
Na 14 dagen broeden kwamen binnen 2 dagen tijd alle eieren uit. De jongen werden voorbeeldig door beide ouders gevoerd. Aanvankelijk met diepvries buffalowormen en diepvries pinky's, later aangevuld met wasmotlarven en witte meelwormen. Diepvries krekels en/of levende redrunners werden niet gevoerd. Daarnaast hadden zij de beschikking over universeelvoer, vruchten- en insectenpaté, pellets C19 en Beokorrel. Tevens kregen zij dagelijks een stukje fruit in de vorm van appel, peer of sinaasappel.
Na 13 dagen vlogen alle 4 de jongen uit. Ze zaten goed in de veren en konden al aardig vliegen. Helaas lag na 3 dagen het grootste jong met opengesperde bek dood onder de struiken. Gestikt?
De andere jongen groeiden voorspoedig op. Op een dag zag ik dat de moeder een poot liet hangen alsof die verlamd was. Ze steunde er niet eens op. Toch bleef zij met de man haar jongen doorvoeren. Opvallend was dat zowel de pop als de jongen beschadigingen aan de kop hadden alsof zij 's nachts opgeschrikt waren en zich met het vliegen in het donker verwond hadden. Deze verlamde poot bleef zeker 2 maanden lang het geval. Ik had haar al bijna afgeschreven, toen ik op de dag af zag dat ze voorzichtig haar poot weer ging gebruiken. Op dit moment is er helemaal niets meer te merken van deze stoornis.

◄ ***uitgevlogen jongen.***

Het tweede koppel dat ik in mijn bezit heb bestaat uit een jonge pop van 2010 en een overjarige ongeringde man. Ook dit koppel maakte een nest. Dit ging niet zo eenvoudig. Ondanks diverse aangeboden broedbakjes wilden zij perse een nest bouwen in een struik, echter steeds viel het nestmateriaal op de grond. Een bakje geplaatst op de betreffende plaats bood ook geen soelaas. Er kwam geen

fatsoenlijk nest tot stand. Inmiddels had de pop wel een ei gelegd dat echter kapot ging tijdens de bouw.
Tenslotte heb ik een oud merelnest in de nestschaal geplaatst. Dit bleek de oplossing, het oude merelnest werd mooi afgewerkt met kokosvezel en er werden 3 eieren gelegd. Deze werden trouw bebroed. Na .. dagen broeden kwam er 1 jong uit, 2 dagen later volgden de andere 2 jongen. Echter na 3 dagen bleken de jongen koud en dood in het nest te liggen. Mogelijk werd de pop 's nachts gestoord en is ze van het nest gegaan waarna de jongen stierven. Of was het onervarenheid van de pop? Dus, helaas van dit koppel geen nakomelingen.

Na het seksen bleken de jongen 1 man en 2 poppen te zijn.